



FICHA TÉCNICA

Kira

Denominación de tipo: ABONO CE
Quelato de Zinc (Zn)

Nombre comercial: DIOXI KIRA[®]

Formulación: Sólido

pH de la formulación: 6,0

Color: Blanco

Solubilidad en agua: Miscible

Categoría de peligro: No aplica

Presentaciones comerciales: 1 kg - 5 kg

Composición percentual: (% en p/p)

Zinc (Z) Soluble en agua 11,00 %

Zinc (Z) Quelatado 9,50 %

Agente quelante: EDTA

Principales compuestos de la formulación:

Zinc (Zn)

Grupo: E.1.7(b)

Registro: Reglamento (CE) n° 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de Octubre de 2003.

Descripción: DIOXI KIRA[®] está desarrollado para mitigar los efectos de los patógenos mediante actuación, translaminar y de contacto. • Preventivo y curativo • Resistencia al estrés • Amplio espectro de acción • Prevención de resistencia de las enfermedades.

Recomendaciones: Es un fertilizante para uso foliar, recomendado para disminuir las carencias de Zinc (Zn) en el cultivo. Apto para todo tipo de cultivo, no genera fitotoxicidad. Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas. Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas.

Recomendaciones específicas: Leer detenidamente la etiqueta del producto a seguir las indicaciones de uso.



Grupo E.1.7(b) del Reglamento (CE) n° 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de Octubre de 2003. Apto para su uso en agricultura ecológica conforme a la UNE 1425000 - Insumos utilizables en la producción vegetal ecológica. Fertilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo.

CULTIVO	DOSIS	APLICACIÓN
Algodonero		
Cereales (arroz, avena, cebada, maíz, maíz palomero, mijo, sorgo y trigo)		
Cítricos (lima, limonero, mandarino, naranjo, toronjo)		
Crucíferas (brócoli, col o repollo, col de bruselas, coliflor, colinabo, colza y mostaza)		
Cucurbitáceas (calabacita, calabaza, chayote, melón, pepino y sandía)		
Frutillas (arándano, frambuesa, fresa, grosella y zarzamora)		
Frutales de cáscara dura (almendro, nogal, pistacho)		
Frutales de hueso (albaricoque, cerezo, ciruelo, melocotón, nectarina)	0,5 - 1,5 kg/Ha y aplicación	Foliar cada 15 - 20 días Usar 400 - 1000 L/Ha
Frutales pomáceos (manzano, membrillo, peral)		
Frutales tropicales (aguacatero, cafeto, chirimolla, guayabo, litchi, mango, papayo)		
Semillas oleaginosas (ajonjolí, canola)		
Solanáceas (chile, tomate, patata, pimiento, acelga, apio, lechuga, perejil)		
Hortalizas de inflorescencia (alcachofa)		
Hortalizas de raíz (nabo, rábano, remolacha, zanahoria)		
Hortalizas de tubérculos y bulbos (ajo, camote, cebolla, patata, yuca)		
Leguminosas (chícharo, frijol, garbanzo, lenteja, soya)		
Olivar		
Piña		
Plátano y banano		
Vid		