

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

ZASCA®

NÚMERO DE REGISTRO

ES-00656 – Denominación común del producto ACEMUR

COMPOSICIÓN

Acetamiprid 20% p/p (200 g/Kg).

FORMULACIÓN

Polvo soluble en agua (SP).

DESCRIPCIÓN

ZASCA® es un formulado que contiene 20% de acetamiprid como materia activa. Es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión sobre un amplio espectro de insectos perjudiciales para los cultivos, alterando el comportamiento de su sistema nervioso.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



ATENCIÓN

H302 Nocivo en caso de ingestión.
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
P261 Evitar respirar la niebla de pulverización.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P280 Llevar guantes, mascarilla y prendas de protección.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón abundantes.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 Recoger el vertido.
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN

Envase 500 g

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal procurando recubrir toda la parte aérea del cultivo. Aplicar desde que empiezan a crecer los brotes hasta que se inicie la caída de los frutos jóvenes (BBCH 31-71).

Para preparar el caldo de pulverización, llenar primero el tanque hasta la mitad aproximadamente de su capacidad, verter la cantidad requerida de ZASCA® y completar con agua el resto del volumen a aplicar manteniendo el caldo de pulverización en agitación constante.

Cultivos	Plaga	Dosis	Volumen de caldo	P.S (días)
Cítricos	Pulgones (Eficaz frente a <i>Aphis spiraecola</i> , <i>Toxoptera citricida</i> , <i>Toxoptera aurantii</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	0,025% (25 g por cada 100 L de agua) con un máximo de 500 g/ha por tratamiento. Se puede repetir el tratamiento en un plazo de 30 días si persiste la infestación	800-2.000 l/ha	No tratar después del BBCH 72.

PRECAUCIONES

No mezclar con productos de reacción alcalina. En todo caso antes de realizar cualquier mezcla realizar una prueba previa. No aplicar más de dos veces por ciclo de cultivo.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para el manejo de la resistencia, Acetamiprid pertenece al grupo de insecticidas IRAC 4A. Cualquier población de insectos podría contener individuos resistentes a Acetamiprid y a otros insecticidas del grupo IRAC 4A. Este fenómeno puede ocurrir si estos insecticidas son utilizados continuamente. Estos insectos resistentes pudieran no ser controlados por ZASCA® o por cualquier insecticida perteneciente al grupo IRAC 4A. Para minimizar los fenómenos de resistencia, evitar repetir de forma exclusiva los tratamientos con un insecticida perteneciente al mismo grupo. Alternar o mezclar con insecticidas pertenecientes a otros grupos.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según IRAC:

GRUPO 4A INSECTICIDA

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.