

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

PUNTAL®

NÚMERO DE REGISTRO

23.788 – Denominación común del producto CARFAL WG.

COMPOSICIÓN

Fosetil-Al 80% p/p (800 g/Kg).

FORMULACIÓN

Granulo dispersable en agua (WG).

DESCRIPCIÓN

Fungicida sistémico, con capacidad de traslocación ascendente y descendente, incluyendo el sistema radicular. Es recomendado en el control preventivo y curativo de Oomicosis, incluso las que se presentan a nivel de cuello-tronco (aguado-gomosis parasitaria y podredumbre del cuello).

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



ATENCIÓN

H319 Provoca irritación ocular grave.
 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
 P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
 P261 Evitar respirar la niebla.
 P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
 P280 Llevar guantes/prendas/gafas o máscara de protección.
 P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

PRESENTACIÓN

Saco 1 y 5kg

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal por vía foliar y, además, mediante riego por goteo en cítricos.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	CONDICIONAMIENTOS	P.S.
Cítricos	Aguado, gomosis y phytophthora	250-300 g/hl	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un máximo de 2,5-4,5 kg/ha. Contra gomosis también se puede aplicar, como alternativa, mediante riego entre la aparición de los primeros pétalos y la maduración de los frutos, a una dosis de 5-25 g/árbol, con dos aplicaciones por campaña y sin superar el máximo por hectárea antes indicado.	15

FICHA TÉCNICA

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	CONDICIONAMIENTOS	P.S.
Pepino y calabacín	Mildiu	250-300 g/hl	Para tratamientos al aire libre y en invernadero realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un máximo de 1,25-4,0 kg/ha y un intervalo mínimo de 15 días. El momento de aplicación desde BBCH 20 (primer brote lateral primario visible) a BBCH 39 (el tallo principal alcanza la altura típica para la variedad).	15
Vid	Mildiu	250-300 g/hl	Realizar un máximo de 4 aplicaciones por campaña con un máximo de 2,5 kg/ha.	28

OBSERVACIONES

Para conseguir una actuación eficaz del producto deben efectuarse las aplicaciones durante el período de crecimiento activo de la planta.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

GRUPO	33	FUNGICIDA
-------	-----------	-----------

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.